

永安國中全球資訊網 - 和諧--活力--智慧--創新

為加強學校諾羅病毒防治及因應乾旱之衛生防範，請依說明事項，落實衛教宣導及疫情通報作業，以維護教職員工生健康，請查照。

訓導處(體育&衛生)

發表人：

張貼在：2015/2/26 9:17:53

主旨：為加強學校諾羅病毒防治及因應乾旱之衛生防範，請依說明事項，落實衛教宣導及疫情通報作業，以維護教職員工生健康，請查照。

說明：

一、冬季與初春是諾羅病毒及輪狀病毒好發的季節，病毒性腸胃炎傳染力極強，主要是經由糞口傳染，透過曾與病人接觸、食用遭污染的食物或飲料等都可能造成感染，感染後1-3天開始出現腸胃炎症狀，視個人健康狀況，症狀可能持續1-10天。主要症狀為水瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，嬰幼兒、老年人、免疫不全者症狀可能較為嚴重。

二、有關預防諾羅病毒疫情及因應乾旱衛生防範措施，請各校注意宣導事項如下：

(一)諾羅病毒等腸胃道感染疾病係透過糞口途徑傳播，請加強衛生教育宣導，包括不生食、不生飲及養成勤洗手的良好個人衛生習慣等；校園內應提供完善充足的洗手設備，並備有肥皂或洗手乳，以利維護個人衛生；因應乾旱缺水時，可使用乾洗手或70%酒精代替洗手。

(二)請轉知師生及家長注意個人及飲食衛生，並加強學校清潔人員衛生教育宣導，防範腸胃炎疫情發生。

(三)請學校加強校園食品安全管理，對於設有廚房者指定專人督導，外訂盒餐不關閉外賣櫃委託代表到廠了解供應食材來源、環境衛生與食品調理過程應符合衛生條件等措施，食物或飲用水應充分煮熟（沸），且不吃生冷食物或生飲水，餐後清洗需確實，以減少病源傳播的風險。

(四)諾羅病毒對於環境及消毒藥品具有較高的抵抗力，病患的糞便或嘔吐物應使用較高濃度的漂白水消毒處理，以去除其傳播能力。

三、相關防疫資訊，請依據衛生署福利部疾病管制署網站專業版（首頁>傳染病介紹>其他傳染病>病毒性腸胃炎）進行防疫措施。